

任意予防接種ワクチン一部助成のお知らせ (令和6年度)

木城町では任意予防接種（おたふくかぜ・三種混合・インフルエンザ・不活化ポリオ・大人の麻しん・風しん）の費用を一部助成しています。

●対象者及び内容

【対象者】木城町に住所のある方で下の対象年齢に該当する方

種 類	対象年齢	接種回数	助成額(A) 1回当たり
おたふくかぜ	1歳～2歳未満	1	3,500円
	5～7歳未満（就学前1年）	1	
三種混合（R2～）	5～7歳未満（就学前1年）	1	2,500円
インフルエンザ （※10月～2月）	生後6か月～13歳未満	2	2,000円
	13歳～19歳未満（高校3年生）	1	
	19歳～65歳未満	1	
	妊婦	1	全額（※）
不活化ポリオ （R5～）	5～7歳未満（就学前1年）	1	5,000円
麻しん・風しん 混合ワクチン	妊娠を希望する女性及びパートナー 又は妊娠中の女性のパートナー ※詳しくは裏面をご覧ください	1	6,700円

☆自己負担額＝予防接種費用－（A）

（※）妊婦の方は、立て替え払い後、費用助成の申請をお願いします。

●接種方法

- ①木城町指定医療機関に直接予約してください。（予診票は医療機関にあります）
- ②予防接種を受ける際は、母子手帳、保険証、診察券などを持参してください。
- ③予防接種費用から助成額を差し引いた料金を窓口でお支払いください。

問い合わせ：木城町保健センター（電話 32-4010）

●指定医療機関 妊婦の方は、医療機関の指定はありません。

医療機関によって、予防接種の種類や料金、診療時間が異なります。
予約の際に確認してから接種してください。

※指定医療機関以外で接種した場合は全額自己負担になります。

●予防接種を受ける前に…

医療機関名 50音順 （電話番号）	おた ふく かぜ	三種 混合	不活 化ポ リオ	インフル エンザ	麻しん 風しん 混合ワクチン
いわみ小児科医院 42-1500	○	○	△	○ （高校生・19～65歳未満・ 妊婦不可）	○
大森内科医院 22-0055	○	△	△	○ （妊婦不可）	○
おおやまこどもクリニック 32-8303	○	○	△	○ （高校生・19～65歳未満・ 妊婦不可）	×
おりたこどもクリニック 32-5522	○	○	○	○ （19～65歳未満不可）	○
木城クリニック 32-3322	△	△	△	○ （生後6か月～13歳未満不可）	○
たかやま小児科 23-4423	○	○	○	○	○
永友胃腸科内科医院 22-3320	○	○	○	○ （妊婦不可）	○
永友慶子小児科 23-1082	○	○	○	○ （妊婦不可）	○

この予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種です。
接種にあたっては、予防接種による効果や副反応、健康被害救済制度などを理解した上で接種してください。

※裏面もあります↓

麻しん・風しん（MR）の予防接種を一部助成します

接種対象者	接種日に木城町に住民票のある方 風しん抗体価が一定以下の方（※１）で （HI 法 16 倍以下または EIA 法 8.0 未満） １．妊娠を希望する女性及びパートナー ２．妊娠中の女性のパートナー ただし、妊娠中の女性は接種できません。
接種ワクチン	麻しん・風しん混合ワクチン（MR ワクチン）のみ
接種回数	１人につき１回のみ
接種方法	皮下注射 １回
助成期間	令和 6 年 4 月～令和 7 年 3 月
委託医療機関	表面の医療機関一覧を参照
助成額	6,700 円 ※接種料金から助成額を引いた差額が自己負担額です。
接種の流れ	①表面にある指定医療機関に事前に予約する。 ②抗体検査を受けるか、抗体価が低いと分かる書類（母子手帳等）を持参する。 ③抗体価が低い場合は、予防接種を受ける。 予防接種の予診票は医療機関に置いてあります。
問い合わせ先	木城町保健センター TEL（32-4010）

（※１）風しん抗体検査を受けていただくか、抗体価が低いと分かる書類（母子手帳等）を医療機関へご持参ください。
風しん抗体検査の費用について、自費となります。

そもそも風しんとは？

人からのくしゃみ、咳のしぶきなどで感染します。主な症状は、発しん、発熱、首のうしろのリンパ節が腫れるなどがあります。一般的には症状は軽く、数日で治まりますが、

妊婦が妊娠早期にかかると、先天性風しん症候群と呼ばれる病気により、心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性があります。

ワクチンを接種して、妊婦さんとその子どもを守りましょう！

麻しんも風しんと一緒に予防しましょう

麻しん（はしか）は、空気、人からのくしゃみ、咳などのしぶき、接触等によって感染します。主な症状は、かぜのような症状（発熱、せき、鼻汁、めやに等）が 4～5 日続きます。肺炎・脳炎・中耳炎等の**合併症を引き起こす**ことが多いので注意が必要です。麻しんは免疫がない人がかかると、**ほぼ 100%発病**と言われています。

※妊娠中の女性は、接種できません。
※妊娠可能な方は、約 1 か月避妊をした後、接種して下さい。
※接種後、約 2 か月は妊娠を避けることが必要です。